

INSTRUCCIONES DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

Dietmar Kennel DDS
PEDIATRIC DENTIST



Es importante que usted siga estas instrucciones para la seguridad de su hijo(a). Complicaciones innecesarias pueden resultar por falta de no seguir estas instrucciones.

ACTIVIDADES: NO planee o permita actividades para su hijo(a) después del tratamiento. Permita que su hijo(a) descanse. Supervise cualquier actividad, por el resto del día.

VIAJE A CASA: Idealmente, un adulto debe manejar el auto para llevar al niño(a) a la casa, y otro adulto responsable debe cuidar de él mientras llegan a la casa. Vigile cuidadosamente al niño(a) por si tiene algún problema respirando, y asegúrese que vaya amarrado en la silla del auto o en su porta bebé. No deje que su hijo(a) duerma con su barbilla para abajo pegado a su pecho.

Que COMER y TOMAR después del TRATAMIENTO: No es de extrañar que el niño(a) experimente un poco de náuseas después de la cirugía. Después del tratamiento, lo primero que debe tomar es agua o cualquier cosa que le dé la enfermera en el hospital. Líquidos de color claro (jugos de fruta, Kool-Aid, Gatorade, ginger ale, consomé, etc) pueden ser tomadas después. Tomar por poquitos es preferible y no tragos en gran cantidad. Comidas blandas se pueden consumir cuando se desea (puré de papa, yogur, sopas de consomé, pudin, helados o nieve, etc).

MEDICINAS RECOMENDADAS: Si su hijo(a) ha tomado Tylenol o Motrin anterior sin ningún problema o alergia, se recomienda que se los dé como indicado en el frasco para cualquier molestia.

TEMPERATURA ELEVADA: La temperatura de su hijo(a) puede elevarse a 101°F (38°C) por las primeras 24 horas después del tratamiento. Dándole Tylenol cada 4 horas o Motrin cada 6 horas y líquidos puede aliviar esta condición. Temperatura mas de 101°F (38°C) es razón para llamar a la oficina de Lubbock KIDS Dental.

EXTRACCIONES: Si su hijo(a) se le removieron dientes, una pequeña cantidad de sangramiento es normal. NO DEJE que su hijo(a) escupa con fuerza, porque esto causará más sangramiento. Para no irritar la sangre coagulada, NO enjuagarse muy fuerte por las primeras 24 horas.

CEPILLAR DIENTES: Su hijo(a) ha recibido una limpieza de dientes y varnis de fluoruro en su tratamiento de hoy; no le cepille los dientes ni use el hilo dental hasta mañana. Es MUY IMPORTANTE que le cepille los dientes y use el hilo dental comenzando mañana en la mañana y diariamente en adelante, para prevenir infección y algún problema dental en el futuro. (ES NORMAL que las encías sangren alrededor de las coronas. Cepillando es la única manera que las encías dejarán de sangrar y se pongan saludables. Los números que se encuentran encima de las coronas se borrarán en una semana.)

SOLICITE CONSEJO: En caso de una emergencia llame al 911.

Si hay algún problema, llame a la oficina de Lubbock KIDS Dental. Si por alguna razón no le regresamos su llamada y usted piensa que su hijo/a necesita atención inmediata, llame al departamento de emergencias en el hospital cerca de su casa:

- Si continua vomitando más de cuatro horas.
- Si la temperatura se mantiene elevada más de 101°F (38°C) o si se mantiene después de 24 horas.
- Si tiene alguna dificultad respirando o si hay alguna descoloración en la piel.
- Si hay alguna cosa que le concierne.

En caso de una emergencia dental o alguna pregunta después de la cirugía favor de llamar a nuestra oficina al 806-749-5437. El numero de teléfono móvil de Doctor Kennel: